

Pavo Colostrum

Alimentación complementaria para los potros recién nacidos.

El potro recién nacido no dispone de ningún anticuerpo para hacer frente a las infecciones. El potro sólo produce la cantidad suficiente de anticuerpos cuanto tiene 3-5 semanas de vida, por lo que para mantener una buena salud durante este período, debe adquirir estos anticuerpos vía calostro. Los anticuerpos solo pueden cruzar la pared intestinal durante el primer día de vida, siendo las primeras 12 horas de vida cuando mayor absorción se da. Después de las primeras 24 horas los anticuerpos no pueden ser asimilados

Propiedades Pavo calostro

- Aporta al potro recién nacido los anticuerpos necesarios para su protección ante las infecciones.
- Asegura el desarrollo natural para resistencia y vitalidad.
- Previene problemas de diarreas

Modo de empleo:

Calentar 1 litro de leche yegua o de leche maternizada a una temperatura caliente (38-40 ° C). (Si no dispone de leche de yegua o leche maternizada puede utilizar leche descremada.) No utilice simplemente agua para mezclar el calostro Pavo, porque el agua no contiene vitaminas. Agregar el contenido completo del sobre "Pavo calostro", y revuelva hasta que todo quede disuelto. Administre al potro unos 250 ml del calostro reconstituidos ((38-40 ° C) cada hora, utilizando una botella con tetina o mediante un cubo

Se recomienda calentar el calostro y mantenerlo caliente al baño maría.

Nunca usar un microondas para calentar Si el potro no quiere comer, puede tratar de estimular su apetito colocando azúcar en su lengua.. No administre más de 500 ml de calostro por hora, podría causarle diarrea. Vigile la higiene, asegúrese que sus manos estén limpias cuando prepare el calostro, y que cubos, botellas y tetinas estén limpios.

-Utilizar pavo calostro si la yegua tiene problemas para alimentar al potro al nacer, (administrar Pavo calostro preferentemente durante las tres primeras horas de vida y como máximo a las 12 horas de vida)

-Si el potro se encuentra débil o si no recibe nada de calostro de la madre, es preferible administrar una segunda dosis de Pavo calostro.

-Para mayor seguridad, programe una visita del veterinario para controlar que el potro no tenga ninguna enfermedad.



Presentación: Sobre hermético de 150 g

Características analíticas:

Proteína Bruta: 40 %, Grasa Bruta 20 %, Fibra Bruta 0 %, Cenizas brutas: 5 %





Pavo Colostrum

El calostro es la primera leche que produce la yegua. Esta leche contiene altos niveles de anticuerpos que protegen al potro de infecciones durante los primeros meses de vida.

- Sin embargo, en ocasiones una yegua puede morir durante o inmediatamente después del parto. En este caso, intente ordeñar tanto calostro como sea posible y déselo al potro con un biberón.
- Si durante el parto surgen problemas con la yegua o el potro contacte con su veterinario, el tiempo es un factor crítico para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Instrucciones de uso

Paso 1: preparación de 1 litro de leche para potros

1. Coja un recipiente con una capacidad mínima de 1 litro.
2. Ponga 300 ml de agua fría.
3. Llene con 400 ml de agua hirviendo. Con esto conseguiremos 700 ml de agua a 60°C aproximadamente.
4. Añada 1 cucharón (± 100 gramos) de Pavo Foal Milk y remueva hasta que se disuelva por completo.
5. Complete con 300 ml de agua fría, sin dejar de remover. La cantidad final será 1 litro de leche tibia para potros (a 40°C aproximadamente).

Paso 2: preparación del calostro

- Moviendo constantemente, incorpore el contenido completo de una bolsa de Pavo Colostrum (± 150 gramos) al litro de leche tibia que ha reconstituido. Remueva hasta que esté completamente disuelto.

Paso 3: administración del calostro

- Corte la punta de la tetina con unas tijeras. Por esta pequeña abertura el potro podrá amamantarse.
- Administre con el biberón 250 ml de calostro tibio (40°C) cada hora.

Repita los pasos 1 a 3 para preparar una segunda bolsa de Pavo Colostrum.

Después de administrar la segunda bolsa, se puede alimentar al potro solamente con Pavo Foal Milk, siguiendo las instrucciones el programa de alimentación.

Consejos para la preparación:

- Recomendamos calentar el calostro o mantenerlo caliente al baño maría. El uso del baño maría evita que se cuaje o se queme.
- Nunca caliente el calostro en un microondas. Las temperaturas altas pueden causar que los anticuerpos pierdan su poder protector. No obstante, si se puede calentar la leche para potros en microondas.

Consejos de alimentación

- Si el potro no demuestra mucho interés por el calostro se le puede estimular el apetito frotándole un poco de azúcar en la lengua.
- No fuerce al potro al alimentarlo flexionándole la cabeza hacia atrás. Si lo hace, no va a tragar adecuadamente y existe el riesgo de que la leche vaya a parar a los pulmones.
- No administre más de 500 ml de calostro a la hora. Un consumo excesivo puede provocar trastornos intestinales.
- Mantenga una buena higiene. Asegúrese de tener limpias las manos antes de preparar la leche y limpie la tetina, biberón y bebederos minuciosamente después de su uso.

Si quiere un programa de alimentación a la medida para su potro, llame al Pavo Grooming Team al +34 918 075 509. Para más información visite nuestra página web www.pavo.net



Pavo Portugal
Tel. +34 918 075 509